


Bij Sophia Revalidatie onderzoeken we het effect van de behandeling om het revalidatieprogramma te kunnen verbeteren. Zodat wat wij doen echt bijdraagt aan de behandeldoelen van de patiënt.

Sophia
REVALIDATIE




Evaluatie oncologische revalidatiebehandeling



Patiënten die behandeld zijn voor borstkanker, gynaecologische tumoren, lymfomen, leukemie of darmkanker volgen bij Sophia Revalidatie een oncologische revalidatiebehandeling. Bij de start en aan het einde van de behandeling geven patiënten een score voor de door hen ervaren kwaliteit van leven, vermoeidheid en fysieke belastbaarheid. Door deze scores met elkaar te vergelijken, wordt duidelijk of oncologische patiënten een verbetering ervaren na het volgen van de 12 weken durende programma.

ERVAREN KWALITEIT VAN LEVEN VOOR EN NA DE BEHANDELING



PERCENTAGE PATIËNTEN DAT EEN MERKBARE VERBETERING ERVAART

Afname vermoeidheid



67%

Fysieke belastbaarheid



85%

Wat betekent dit?

Het grootste deel van de patiënten van de patiënten die in 2015 een oncologische revalidatiebehandeling hebben gevolgd, ervaren na de revalidatie een afname van vermoeidheid, verbeterde fysieke belastbaarheid en kwaliteit van leven.

De resultaten zijn gemeten met de volgende vragenlijsten en meetinstrumenten: vermoeidheid (MVI), vermoeidheid (MVI), kwaliteit van leven (EQRTC-QLQ-C30) en fysieke belastbaarheid (SWT). Een merkbare verandering is gebaseerd op wetenschappelijke normen (MCID).

Effectmeting oncologie 2015, SR